

Come eseguire una perfetta infusione

Dott.ssa Emanuela Marchesini

Per prima cosa **lavarsi sempre le mani** ed assicurarsi che il piano di lavoro sia il più **pulito** e sterile possibile.

La scelta dell'accesso venoso avviene mediante la **palpazione**.



applicazione del laccio emostatico

Dove? 10-15 cm sopra il sito di inserzione scelto.

Per quanto tempo? 1-2 minuti per non provocare eccessiva stasi venosa.

Quanto stringere? Abbastanza da impedire il ritorno venoso ma non da escludere il flusso arterioso.

disinfezione della zona

- Disinfettare l'area intorno alla sede di iniezione a “**senso unico**”, cioè mantenendo un unico senso di movimento, di solito dall'alto verso il basso.
- Una volta disinfettata l'area, **non toccare** per evitare di ricontaminare il campo.

puntura della vena

- Stabilizzare la vena tenendo il pollice al di sotto del sito di iniezione e stirare la cute.
- Prendere con il pollice e l'indice di una mano l'ago a farfalla e con l'altra mano togliere il cappuccio avendo cura di non toccare l'ago.
- Pungere la cute mantenendo un angolo tra i 10 e i 30 gradi.
- Abbassare l'angolo per evitare di trapassare la vena.
- Far avanzare lievemente l'ago.
- Controllare che ci sia reflusso di sangue.

infusione del farmaco

- Far refluire il sangue su tutta la lunghezza del tubicino e poi raccordare la siringa con il farmaco.
- Iniettare lentamente il concentrato a velocità costante.
- Avere cura di controllare, aspirando, di essere rimati sempre in vena.
- Durata infusione: 2-5 minuti.

rimozione dell'ago

- Prendere l'ago per le ali.
- Sollevarlo.
- Estrarre l'ago lentamente ma con decisione.
- Premere con un tampone sul punto di iniezione.
- Tenere il tampone per circa 3 minuti ed evitare di sfregare.

riordinamento

- L'ago, la siringa, i tamponi e i flaconi non devono costituire un pericolo per gli altri.
- Rincappucciare gli aghi con molta cura e reinserire tutto all'interno della scatola originaria.
- Buttare il tutto nell'indifferenziato.